

(13) 龙胆(*Gentiana scabra* L.) 本年产 3 万市斤, 每年 3—5 月采收。为多年生草本, 叶披针形, 对生, 秋日莖稍, 叶腋开紫色鐘狀花。果为蒴果。根莖上着生众多肉質根, 黄色。药用部份为根, 作苦味健胃剂。

(14) 白头翁(*Pulsatilla chinensis* (Bge) Regel.) 本年产 5 万斤, 每年 2—3 月采收。为多年生草本, 叶根生, 二回羽狀深刻, 春天开紫色大花。根瘦長, 棕黄色, 有分枝。药用部份为根, 用以治疗阿米巴痢疾。

(15) 直立百部(*Stemona sessilifolia* (Miq.) Fr. & Sav.) 本年产 10 万斤, 每年 3—5 月采收。为多年生蔓性草本, 叶輪生, 卵圆形, 初

夏腋生淡綠色花, 根为塊根, 数十个簇生於一处。药用部份为根, 为止咳祛痰剂, 杀皮膚寄生虫及治虱有效。

(16) 首烏(药用何首烏 *Polygonum multiflorum* Thunb.) 年产量不詳, 每年 2—3 月采收。为多年生草本, 莖纏繞, 分岐众多, 叶互生, 狭卵形, 基部心臟形, 腋生或頂生圓錐花序, 果实为瘦果。药用部份为根, 根褐色, 呈歪塊狀或不定形。药用多作为补剂。

以上的一些材料, 說明了滁县一带蕴藏着丰富的药用植物。这簡單的报导, 提供有关方面参考。

萍乡丘陵的一些药用植物

王文采

在一九五四年春秋兩季, 作者参加中国科学院江西植物調查队在萍乡县北部宣德、上栗、長乐、桐木、長坪等区工作, 訪問上述各地农民、中医后, 知道調查区野生植物中有不少药用植物。本文就調查記錄, 选其一部分报告於后。

調查区位於長江中游, 江西省西部, 东徑近 114°, 北緯近 28° 处。年雨量甚丰約 1500 毫米上下, 但多集中春、夏二季, 秋冬常形成旱季。冬季有雪, 寒露后有霜, 無霜期約 9 个月。

調查区大部为長江以南具有紅黃壤的典型丘陵地区, 小型山巒此起彼伏, 連綿不断, 其相对高度約 150 公尺上下。

下述的植物以分佈普遍程度大小为序。每植物依其科屬、習性、生長环境、用法等次序叙述。

1. 繸木, 土名志柴 (*Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv.) 金縷梅科, 通为灌木。适应力極强, 路边、丘陵、山地、石灰山地到处可見, 也能耐陰, 有时在密林中可成乔木狀。分佈华中、华南。治气痛, 混身串痛, 用根煮水服之。

2 黃荆柴 (*Vitex negundo* L.) 馬鞭草科,

灌木, 叶对生, 掌狀深裂, 夏季开花, 花唇形, 紫色, 常生路边或溝旁, 与烏泡子 (*Rubus tephrodes* Hance) 等同生。莖常用以編篾等器具。能治手癱, 將莖切成段, 中間燒时兩端即溜出汁液, 服汁后手即好。

3. 烏藥 (*Lindera strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F. Vill.) 樟科, 灌木, 竹杉林灌叢边常見, 溝边較陰处也可生長。农民多砍作柴燒及药用。

4. 烏泡子 (*Rubus tephrodes* Hance) 薔薇科, 帶刺藤本。溝边、路边、林边、石灰山之灌叢中均常見, 果十月熟, 香甜可食。广佈华中、华南。新萌發的嫩莖煮水可治牙痛。

5. 七皮勒又名青絲勒 (*Rosa microcarpa* Lindl.) 薔薇科, 有刺藤本。常与前者同生, 分佈甚广, 五月开花, 花白色, 密, 甚美丽。叶子可消膿腫。

6. 牛嘴同 (*Aster trinervius* Roxb.) 菊科、草本。路边或竹杉林边常見。用根泡酒擦摔伤处可活血, 根煮水可治蛇咬伤。

7. 野菊花 (*Chrysanthemum indicum* L.) 菊科, 草本。深秋开黄花, 山地路边, 林边普遍生長。可作解毒、清暑剂。

8. 黃梔子 (*Gardenia florida* L.) 茜草科, 灌木。花五月開放, 白色, 有濃香味, 馬尾松林灌木叢中常見。果為清熱藥。

9. 仙鶴草, 即龍芽草, 又名毛黃連 (文岐鄉) (*Agrimonia pilosa* Lebd.) 薔薇科, 草本。林邊草地生長。根, 葉煮水吃可治疳積, 並為去毒藥。仙鶴草素即由本植物提取。

10. 白面風 (*Gnaphalium multiceps* Wall) 菊科, 小草本。生長村邊荒地、路邊。植物全體煮水吃, 可去風, 治筋痛。

11. 夏枯草 (*Prunella vulgaris* L.) 唇形科, 草本, 山地路邊陽處常見。可作利尿藥。

12. 馬鞭草 (*Verbena officinalis* L.) 馬鞭草科, 小草本。水田邊、路邊草地常見。藥用為利尿藥。

13. 奶子草, 即地錦 (*Euphorbia humifusa* Willd.) 大戟科, 鋪地小草本, 有白汁。生長在村邊草地或田邊。植物煮水可治小兒奶積。

14. 野鷄尾, 即狗脊 (*Woodwardia japonica* (L. F.) Sm.) 蕨類, 烏毛蕨科, 草本。生杉竹林下, 陰濕土層較厚處常見。可藥用。

15. 算盤子樹 (*Glochidium puberum* (L.) Hutch.) 大戟科, 灌木。路邊常見, 山坡灌木林中也有。根煮水吃, 可治瀉。

16. 拉壁志柴 (*Ficus Martinii* Lévl. et Vant) 桑科, 木質藤本有白汁。生在文岐, 長坪等鄉石灰岩石上, 或村邊屋上及樹上攀附。治風眼、眼痒、發紅。用葉、莖煮水蒸氣薰眼。

17. 半边蓮 (*Lobelia chinensis* Lour.) 半边蓮科, 小草本。植物有白汁, 夏季開粉紅色花, 生水田邊或池塘邊常與三稜草、酢漿草、穀精草等同生, 分佈至兩廣。可治蛇咬, 廣州諺云: “識得半边蓮, 可以共蛇眠”。

18. 趙藤根 (*Allettia reticulata* Bth.) 豆科, 木質藤本。生於馬尾松林灌叢中較陽處, 花紅紫色, 五月開放。根藥用, 去風濕。

19. 大和血, 又名風藤 (*Sargentodoxa cuneata* (Oliv) R. et W.) 木通科, 木質藤本。葉掌狀, 具三小葉, 喜生油茶林或竹林邊、灌木叢中陽處, 丘陵地區較少, 在萍鄉武功山 1000 公尺以下生長很多且高大。根及莖可治風濕、活

血, 萍鄉等縣城常有賣者。

20. 無娘藤 (*Cuscuta* sp.) 旋花科, 寄生草質藤本。生路邊、石灰山灌叢中, 九月開花。可治蛇咬, 用植物汁合銀朱敷傷處。

21. 土茯苓, 又名冷飯兜藤 (*Smilax glabra* Roxb.) 百合科, 草質藤本。馬尾松林灌叢中常見。根敗毒, 葉可泡茶。

22. 七葉黃經 (*Pittosporum glabratum* Lindl.) 海桐花科, 灌木。生於竹杉林下, 石灰山灌叢較陰處, 在萍鄉南部之武功山可升達 1000 公尺左右, 常見, 但數量少。治蛇咬傷。根服用, 藥煮水洗傷處。

23. 高茶 (*Ardisia crenata* Sims) 紫金牛科, 小灌木。葉下面紫色, 果球形十月熟, 朱紅色, 甚美麗。生竹杉林下陰濕處。根作跌傷藥。

24. 小活血, 又名活血丹, 錫子草 (*Rubia cordifolia* L.) 茜草科, 草質藤本。莖有刺, 葉 4 枚以上輪生。竹林灌叢上攀附, 不常見。根活血。

25. 金姚散, 即南天竹 (*Nandina domestica* Thunb.) 小蘗科, 灌木。五月開花, 深秋果熟, 紅色。生於石灰山灌叢下, 陽歧山, 大嶺山地竹杉林下陰濕處少見。蛇藥, 葉子煮水洗傷口, 根可服。

26. 三角蓮 (*Epimedium sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim.) 小蘗科, 草本。生油茶林邊、竹杉林、石灰山灌叢下陰處, 可上升達 1000 公尺。用作去濕及補藥。

27. 奶薯 (*Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. f.) 桔梗科, 草質藤本。僅在南源鄉杉林下及流源鄉陽歧山兩眉峯溝中陰處見之。根可發奶。

28. 烏頭 (*Aconitum Carmichaeli* Debx.) 毛茛科, 草本。花十月開放, 藍色, 美麗, 僅在陽歧山灌木草地見之, 本種在兩湖、雲南、貴州、四川、陝西、甘肅寺廟廣為栽培。根可治跌傷。

29. 八仁蕨 (*Scrophularia nipoensis* Hemsl.) 玄參科, 草本。僅在南源鄉陽歧山溝邊灌叢邊採之。根可作蛇藥。

30. 丹參 (*Salvia miltiorrhiza* Bge.) 唇形

科，草本。仅在馬良乡村边草叢中見之。根藥用，为强壯通經藥，治子宮出血等症。

31. 枸杞 (*Lycium chinense* Mill.) 茄科，小灌木。仅在桐木区小埠老乡村边見之，果十一

月熟，紅色。可作藥用。

32. 蛤蟆藤，即海金沙 (*Lygodium japonicum* Sw.) 蕨类，海金沙科，草質藤本。馬尾松林中灌叢中常見。藥用清小便。

湖北咸寧藥用植物採集記

丁 忠 譽*

情况概述:

为了配合中国藥学会中藥的整理工作，1955年7月中国藥学会武汉分会組織了一队生藥採集队，由武汉市藥品檢驗所及湖北医学院等四人組成，赴湖北省咸寧县进行採集，在出發前曾作了一些准备工作，7月10号出發了。这次承蒙咸寧县衛生科，及有关部門，区乡人民委员会，以及农民兄弟，尤其是藥农的大力支持和协助，初步的了解了咸寧的产銷情况，进行了标本的採集工作。据县合作社及衛生科的了解，咸寧产藥种类很多，常用藥材約200种以上(由公司收購的仅40多种)，各区分佈大致相同，产量主要以汀泗桥、高桥、馬桥、橫溝桥为主。根据藥农了解，当地出产的藥材約千种以上，但大部份为土方草藥，其价值不高，有許多名称都沒有听过，也無記載可查。了解了这些情况，我們就决定到汀泗桥(咸寧县第二区)採集。

我們7月12日到汀泗桥，以彭碑乡为据点，由一藥农帶領上山，在周圍30华里远近地区連續採集了三天。此次採集，因時間的短促，又只限於夏季与在一个区的一部份地段进行，加上我們經驗不足，故此次所採集調查未能全面。現仅將咸寧二区部份地区初步採集調查情况，摘要綜合报导如后:

产銷概况

咸寧二区的中藥事业概况，可以从主要出产情况，和国营公司收購兩方面来談。

(1)二区十家王山、父子嶺、九路窩、神龙山、桃李尖山等地，主要出产：甘遂、淡竹

叶、百合、苦參、射干、八月札(預知子)、白前、土花楸、青木香、紅丹參、黃藥、通草、五加皮、麦冬、紫菀、白及、百部、木通、細辛、天南星、天門冬、玉竹、威灵仙、野薄荷、山姜、黃精、大戟、桂皮、桂枝、鳳尾草、血藤、紫苏、馬鞭草、常山、烏藥、十大功劳、淫羊霍、白藥、續断、貫众、仙鶴草、益母草、虎耳草、葛根、清風藤(以上皆为野生)、瓜蒌、鷄冠花、枇杷叶、曼陀罗(为栽培品)夜明砂、貝母、木蓮、天葵子、金銀花、鬧羊花、車前草、山楂、木別子、谷精草、山梔子、龙胆草、側柏叶、辛夷花、茯苓等。

(2)二区收購品种：烏藥、天門冬、苏子、苏梗、血藤、清風藤、茯苓片、辛夷花、黃藥、玉竹、百部、威灵仙、車前草、鬧羊花、側柏叶、五加皮、金銀花、天葵子、麦門冬、木蓮、甘遂、苦參、貝母、黃精、夜明砂、枇杷叶、淡竹叶、土花楸、瓜蒌子、瓜蒌皮、山楂子、木別子、桑枝片、山梔子、白前、龙胆草。

据藥农講，二区所产藥材，在二区各地皆有，其数量亦不为少，由合作社收購的，如土花楸，在55年一个季度里就收購了一百廿多担，其他烏藥，黃藥等均可收購近百担，但因分佈零散，收集不易，採集時間也多在农閒时期，又合作社在收購方面只限於省县所佈置的收購范围，品种不多，故此所採集之藥材，数量及种类很少，以致許多藥材都不能得到适当的利用。今后如何組織农民从事藥材副业生产

* 武汉市藥品檢驗所